


5 อันดับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



อัตราป่วย **33.8 %**
ต่อประชากรแสนคน (ปี 2562)
เพิ่มขึ้น **1.7** เท่า
จากปี 2558



อัตราการใช้ถุงยางอนามัย
ในกลุ่มเยาวชน **80.3%**

หมายเหตุ : จากผลการสำรวจการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์
กับการติดเชื้อเอชไอวี (BSS)
ของกองระบาดวิทยา ปี 2562

การป้องกัน โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์



ใส่ถุงยางอนามัย
ทุกครั้งที่มี sex

ใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสม
ของน้ำเป็นหลัก

หากใช้ PrEP
(ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี)
ควรใช้คู่กับถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มีโอกาสติดเชื้อ HIV ย่ำกว่าคนทั่วไป

5-9 เท่า



ขอบคุณข้อมูลจาก
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

