


โรคเส้นเลือดสมองตีบ แตกหรืออุดตันเฉียบพลัน

สัญญาณอาการของโรค

B	E	F	A	S	T
					
ปวดหัวบ่อย เวียนหัว มึนหัว บ้านหมุน ทรงตัวไม่ได้	ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน	ใบหน้าเบี้ยว หลับตาไม่สนิท	มือเท้าชา แขน ขาอ่อนแรง หรือชา ครึ่งซีกของร่างกาย	ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด มุมปากตก กลืนลำบาก	เวลา จากระยะที่เริ่มมีอาการ ต้องรับรักษาภายใน 3 ชั่วโมง

ปัจจัยเสี่ยงของโรค

	ภาวะความดันโลหิตสูง		ภาวะเบาหวาน		ดื่มแอลกอฮอล์
	โรคหัวใจ		สูบบุหรี่		ไขมันในเลือดสูง
	ภาวะอ้วน		ภาวะเครียด		

80%
ในผู้ป่วย หลอดเลือดสมอง
ขาดเลือด หรือตีบ

63%
ในผู้ป่วย เลือดออกในสมอง
หรือแตก

