

“โรคไข้เลือดออก”

ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

ปัจจุบัน
พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจาก “คิดว่าโรคไข้เลือดออกไม่รุนแรง”
จึงทำให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้า
ส่งผลให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต

ปัจจัยเสี่ยง

ที่ทำให้มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิต

- มีโรคประจำตัว

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต
ติดเชื้อเรื้อรัง

- ไปรักษาที่โรงพยาบาลช้า

คิดว่าติดเชื้อโควิด 19 จึงซื้อยาฟ้าทะลายโจร
มากินเอง คิดว่าโรคไข้เลือดออกมีอาการไม่รุนแรง

- กินยาลดไข้กุ่มเอ็นเสด (NSAIDs)

เช่น ไอบูโพรเฟน ยาชุด ซึ่งยากกลุ่มนี้ทำให้มี
อาการเลือดออกมากขึ้น

การป้องกัน 3 โรค

โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา โรคไข้วัดข่อยงลาย
เก็บบ้าน เพื่อไม่ให้ยุงเกาะพักเก็บขยะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บน้ำ
ปิดฝาภาชนะ ใส่ทรายกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย,
ป้องกันยุงวางไข่

อาการ

หากมี ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน
และใช้ตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง
ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง
อาจมีจุดแดงเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ทานอาหารไม่ได้
“ ขอให้คิดว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ให้รีบไปพบแพทย์ ”

