




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
PRACHACHUEN



VIRUS ZIKA

ไวรัสซิกา




เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่สู่คนได้
โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค

กลุ่มเสี่ยง



บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการ แพร่ระบาดของโรคซิกา หรืออยู่ใกล้บริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหญิงตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ อาจมีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดควรรีบพบแพทย์

อาการ



มีไข้ ปวดศีรษะ ผื่นแดง ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ เยื่อบุตาอักเสบ อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อย และอาการจะอยู่ประมาณ 2-7 วัน

การรักษา



เป็นการรักษาตามอาการ อาจรักษาโดย พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ ทานยาลดไข้ แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอล ห้ามทานยาแอสไพริน เพราะมียาบางชนิดที่เป็นอันตรายสำหรับการเป็นโรคนี้หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน

การป้องกัน



1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2. สวมเสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย
3. ทายาป้องกันยุง
4. หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของ
5. สงสัยควรพบแพทย์ทันที



www.kasemrad.co.th



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น